

識  
病  
捷  
法

識病捷法卷之六

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

中風門

有三十六名

夫風為百病之長也風之為病善行而數變者也  
天有八風人之臟亦有五風八風之邪有中臟中  
腑中血脉之分西北二方風氣剛勁民病於中風  
者誠有之矣東南二方地卑多濕人病於中風者  
非外中風也皆是濕生痰痰生熱熱生風耳但病

之形狀與中風相似更有中氣之病亦與中風相  
類若便與中風藥治多致殺人凡人年衰氣弱之  
際或因憂喜忿怒房勞傷其臟氣邪氣乘虛而入  
多成此疾壯歲之時無是病也若肥胖之人間而  
有之雖肥而由氣衰所致治斯疾者不辯中風中  
氣不論地方南北不審從外入八風從內熱生五  
風不察元氣虛實不分中血脉中腑中臟混以風  
藥療之名雖活人而反傷人可不慎哉

○中風脉

脉浮盛

脉浮洪

脉絃緊

○中氣脉

脉沉

脉伏

○生脉

脉来虚

○死脉

脉来紧急疾

○不治脉

瘖病脉不至

○不治症有四名

髮直 直視 吐沫 遺尿 汗輟如珠

口開 眼合 手攢 搖頭 面赤如粧

上竅 鼻鼾 頭面青黑者 昏不知人

○死症 有四名十

尋衣 摸床 撮空 指地

○辯驗中風法

中風之病當半身不遂經絡空虛賊邪不散  
或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪為  
口眼歪斜入絡脉皮膚不仁邪入經脉重着  
不勝邪入六腑不識人邪入五臟難言吐沫  
○辯分中風中氣法

風中六腑多著四肢有外證惡風寒拘急不

仁

風中五臟多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目  
瞤大便閉

風中血脈口眼喎斜

氣中與中風相似但手足不甚偏廢為異耳  
氣中六腑不識人

氣中五臟語蹇塞或不言

氣中血脈肌膚不仁重著

治法

凡中風大率主血虛有痰或挾火與濕

凡中風以痰為先補養次之或挾火與濕亦有死血流滯有外中於風

凡中風初中時急搯人中能醒然後用去痰藥二陳湯四物湯四君子湯加減用

凡中風痰擁盛者口眼歪斜不能語言皆用吐法

凡中風輕者醒者用瓜蒂散或蝦汁或稀涎散吐之

凡中風重者口噤者用藜蘆五分或三分麝香

少許灌入鼻內吐之一吐不已再吐之子和  
用三聖散

凡中風虛弱人年老產後久病者俱不可吐  
凡中風氣虛卒倒參芪補之挾痰則濃煎獨參  
湯加竹瀝姜汁

凡中風血虛用四物湯補之挾痰俱用姜汁炒  
過更加姜汁竹瀝能食者去竹瀝加荊瀝

凡中風半身不遂大率多痰在左屬死血血少  
宜用四物湯加桃仁紅花姜汁竹瀝

凡中風半身不遂大率多痰在右屬痰與氣虛



宜用二陳湯四君子湯加姜汁竹瀝

凡中風肥白人多濕氣虛宜四君子湯合五苓散加附子烏頭行經

凡中風因憂思氣鬱右手癱口渴宜補中益氣湯加姜汁竹瀝有痰加半夏貝母

凡中風黑瘦人陰虛火動人宜四物湯加牛膝黃芩黃柏姜汁竹瀝有痰加天花粉

凡中風遺尿屬氣虛參芪補之

凡中風小便不利者不可用利藥宜清其熱熱退自利

偏枯風

半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不  
變智不亂○服神照散加麻黃

風痺

身無疼痛四肢不收智亂不甚言微有知可治  
甚則不能言不治○服伏龍肝湯

內奪風

厥則為瘖痺腎虛所致瘖痺之狀舌瘖不能語  
足廢不能用○服伏龍肝湯

風懿

奄忽不知人事痰涎上迷心竅咽中窒塞舌強  
不語牙關不開手足拘攣氣不升降風中臟則  
危中腑肢體廢其脉短滑或洪數內熱外汗當  
清解消痰祛風

風痺

諸痺類風狀脉緩筋骨痿弱肢體麻痺不仁○  
見痺門

風痊

身如板直遍身鞭強牙關緊急心神昏昧○服  
天麻湯

卒中風

目瞑牙噤無門下藥○用南星搗為末白龍腦  
二件各等分其藥端午合以中指點藥指齒三  
二十次指牙左右其口自開始得下藥

暗風

倒地牙關緊急人事昏沉○用搐鼻三聖散  
走注風

其症兩足疼痛腫起或偏一足痛行履不得其痛  
遊走不定或上項頭目昏亂或走左手或走右  
手或走手指上或一脚指上○服獨活散加黑

蓬元花生姜

賊風

身體拘急古強言澁十足不遂○服漢防已散  
或一字散取出涕涎

如口噤角弓反張○服含公酒

緩風

左癱右瘓拳攣半身不遂脚軟不能行履屈伸  
艱難○服至聖一醉膏

風濕

口眼喎斜大便結澁體重或麻皮膚瘙癢筋脉

拘急言澁手足不遂時覺不仁○

風癔

奄忽不知人喉中噫噫有聲舌強不能言身軟  
自汗口吐涎沫項背強直神志昏憤○服金匱  
九

卒中惡風

倒悶在地口噤不言肝厥尸厥死不識人閉目  
針灸不知痛○服甘竹瀝湯不愈再服還魂湯

風毒

風毒上攻頭面發熱頰赤唇焦眼澁鼻出熱氣

項背拘急○服羌活飲 又風毒入四肢筋脉  
拘攣疼痛服羌活散

熱毒風

頭面壅熱口乾心煩不欲吃○服前胡散  
如心神煩躁頭目昏痛○服天竺黃丸一切風  
熱毒方

肺風

胸滿短氣胃悶汗出噓吸顫掉聲嘶塞身重四  
肢痿多汗惡風時嗽晝瘡夜甚其狀偃卧鼻過  
眉○服五味子湯

肝風

筋脉拘攣手足不收屬風入肝坐踞不得胸背  
強直脇肋脹滿日眩心煩語澁頭面疼痛口眼  
喎斜脚膝無力○服犀角散

心風

多汗惡風善怒心神顛倒語澁舌強口乾面赤  
頭疼翕翕發熱胸背拘急手心熱盛多偃卧不  
得傾倒驚悸汗出恍惚口喎冒昧好笑○服麻  
黃散

脾風



多汗惡風體怠四肢不欲動微黃不嗜食言澁  
口喎肌膚不仁腹膨心煩翕翕發熱神思如醉  
手足不能舉脉浮緩○服獨活湯

腎風

腰疼不得俯仰或偏枯兩耳虛鳴語聲不清面  
色浮腫骨酸疼精神昏潰喜恐好忘體黧黑沉  
重多汗惡風隱曲不利腳冷弱○服獨活散

肉苛風

血虛氣實肌肉不仁名曰肉苛○服苦參丸

血風

婦人頭皮腫痒名曰血風○服消風散

風眩

眩倒屋傳吐逆惡聞人聲○服茯神湯



風眩加目痛耳聾者○服附子散

風眩加煩悶頭運不止○服六神散

風厥

志意不樂身背疼頭多驚呵欠噫氣○服人參

湯

痢風

痢後脚痛緩弱不能行履名曰痢風○服大防

風湯

狂

涎潮牙關緊閉不開○用麝膏鼻中取涎

風痰

頭疼目眩運倒嘔喘恍惚不寧神思昏憤肢躄  
倦痛頭項強硬手足頑麻○服上清白附子丸

偏風

手足一邊不遂筋骨煩疼○服枳殼人參湯

腦風

見腦漏門

目風

見眼科門

漏風

身熱解情汗出少氣因飲酒腠理踈風邪入名

曰漏風○服牡蠣白朮散

內風

又名勞風

因房勞中風多汗出粘衣不能勞事躰盡痛○服附子湯加人參當歸

首風

新浴感風旋暈昏眩名曰首風○服大川芎湯

陽風

見諸血門

泄風

見泄瀉門

獨活散

獨活

附子

當歸

防風

天麻

桂心

錢各一

川芎

甘菊花

枳殼

黃芪

山茱萸

丹參

牛膝

草薢

甘草

細辛

菖蒲

白朮

錢各半

右用水二鍾生

姜五片煎至一鍾不拘時服

犀角散

犀角屑

錢二 石膏 錢二

羌活

半 錢

羚羊角

半 錢

人參

甘菊花

獨活

黃芩

天麻

枳殼

當歸

去 芦

黃芪

芎藭

酸棗仁

白朮

防風

白芷

各 五 分

甘草

三 分

右作一服水二鍾

生薑五片煎至一鍾不拘時服

澡洗藥

乾荷葉

藿香葉

葳靈仙

藁本

各 三 兩

茅香

陵零香

四 兩

香白芷

甘松

各 二 兩

煎湯在無處帶

熱洗澡

獨活湯

獨活

半錢

防風

茯神

人參

附子

前胡

沙參

半夏

旋覆花

黃芪

羚羊角

甘草

銕一

右用水二鍾生姜五片煎

至一鍾不拘時服

治中風牙關緊急方

用甘草比中指節截作五截生油內浸過炭火上炙候油入甘草以物幹開牙關令咬定甘草可人行一里時候又換甘草一截後灌藥極効

白神散

用白梅末不拘多少將揩牙立開蓋酸能收歛  
自然齒骨易開也

# 五味子湯

五味子

杏仁

桂心

各一錢

防風

甘草

赤芍藥

川芎

各二錢

川椒

三分

右作一服用水二

鍾煎至一鍾不拘時服

# 搜風順氣丸

人參

兩半

麻子仁

栢子仁

大黃

各一兩

皂角

威靈仙

二兩

朴硝

五錢

黑牽牛末

一兩

右為末麵糊

和丸如梧桐子大每服五六十丸溫酒送下



還魂湯 千金方內有桂

麻黃

去節六錢

杏仁

五十粒

甘草

二錢

右分作二服用

水二鍾煎七分去滓灌之去口噤幹開若更不下分病人髮左右提搦肩引之藥下漸甦若唇青身冷為人臍即死身和汗出即愈

金箔丸

金箔

研片一百

銀箔

研片一百

犀角屑

研

牛黃

丁香

龍腦

沉香

珍珠末

木香

麝香

琥珀

蓬砂

已上男研

烏蛇

去皮酒浸

雄黃

研

蜀椒

燒

白僵蚕

附子

炮裂去皮

天麻

酒浸

南星

一炮

墨

研

丹砂

各一兩另

防風

去

白附子

炮

甘草

各一分

右將

九味各依製度研為末却入另研藥一處和內

金銀箔入水銀三分同研如泥與諸藥再研和

勻煉蜜為丸如棗豆大每服大人五丸薄苛酒

下水兒二丸薄苛湯化下

### 麻黃散

麻黃

去節

白朮

錢一

防風

去

川芎

錢一

甘草

漢防己

當歸

各一錢

人參

去

羌活

錢一

遠志

茯苓

半錢

川升麻

八分

桂心

五分

右作一服水二鍾

生薑五片煎至一鍾入竹瀝半盞再煎一二沸

不拘時服

十二味正氣散

人參

半二錢

厚朴

半夏

藿香

甘草

茯苓

白朮

石菖蒲

遠志

心去

陳皮

薏苡仁

木香

錢各五

右每服三錢水一盞生姜

三片棗一枚煎至七分不拘時服

搐鼻通天散

川芎

細辛

藜蘆

白芷

防風

薄荷

錢各一

猪牙皂角

刮去皮

右研為極細末每

用少許入蘆筒內吹入鼻中

大防風湯

防風

熟地黃

白朮

羌活

人參

川芎

黃芩

牛膝

附子

當歸

杜仲

芍藥

甘草

右作

服水二

鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

漢防已散

漢防已

黃芩

麻黃

石膏

川芎

赤芍藥

附子

防風

羌活

白朮

杏仁

當歸

右為末

每服三錢

以水一鍾姜半片煎至六分去滓不拘時溫服

稀涎散

晉礬

兩一

猪牙皂角

四箇肥實不

右為末碾勻

每服二錢溫熱水調下以吐為度

獨活散

獨活

去

阿魏

乾

許和

薄餅子

火上

錢

桂心

大黃

炒

赤茯苓

牛膝

鼈甲

炙

羌活

當歸

焙

乾蝎

炒

黃芪

蔓荊子

川芎

麻黃

去

根

木香

各一

吳茱萸

錢

荊芥穗

二錢

麝香

虎骨

酥炙

白花蛇

芫花

各一

狼毒

三錢

同

芫

花於

五錢

內

半夏

分一

牽牛

取頭末

兩

右將狼毒芫

花二味別作一處為末牽牛半夏亦別作一處  
為末其餘衆藥共作一處為末每服芫花狼毒  
半錢半夏牽牛末一錢衆藥末一錢五分共作  
一服臨時時葱湯調下

上清白附子丸

白附子

炮

半夏

湯洗

川芎

菊花

南星

僵蠶

少

陳皮

去白

旋覆花

天麻子

兩

全蝎

一

錢

炒

右為末

薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每

服三十丸食遠生薑湯送下

瓜蒂散

右用瓜蒂末一錢熱水調下吐痰如吐不止者  
以真麝香少許溫水服之瓜蒂一右剉如麻豆  
炒令黃色為細末每服量虛實新久或三錢茶  
末茶一錢酸薤汁一鐘調下若用此法天氣晴  
明陰晦無用如病卒暴者而若用此法吐時辰  
午巳時前春宜吐是天氣在上人氣亦在上也  
一日之氣寅卯辰候也不宜暴亦宜夜先令病  
人隔夜不食服藥有功月熱薤水投凡火要辯  
其人虛實實則瓜蒂散虛則梔子鼓湯滿加厚  
朴不可一槩用之吐罷可服降入利氣安神定

志之劑

天麻湯

天麻

錢五

羌活

人參

桂心

白朮

麻黃

杏仁

各三錢

附子

右剉如麻豆大

每服五錢七分生薑三片水二鍾煎至一盞去滓入酒半盞再煎一沸熱服服後以生薑稀粥投之取汗日三服

治口眼喎斜奇方

桂心用酒煮取汁紙蘸貼患處左喎貼右右喎貼左口一方用大鱈魚一條以針刺頭上血左



喝塗右右喝塗左正即洗去鱧魚血

正活散

治中風舌本強難轉語不止神効

蝎稍去毒

十口

扶苓

一兩

右作二服水二鍾

姜五片煎至一鍾溫服

一字散

烏頭

生用

青礬

各半

右為末每用一字搐入鼻

內取出涕涎

蒜塗法

用橡斗盛蒜泥塗合谷穴右喝左貼正則止之

消風散

荊芥穗

甘草

炙各半錢

陳皮

茯苓

去皮

人參

白僵蚕

炒

藿香葉

防風

川芎

蟬腿

厚朴

羌活

各錢一

右作一服用水二鍾煎至

一鍾不拘時服

小續命湯

麻黃

去節

人參

去芦

黃芩

芍藥

甘草

川芎

杏仁

去皮

防已

各錢一

肉桂

七分

附子

炮去皮

防風

五錢

右作一服用水二鍾生薑

三片煎至一鍾食遠服

大秦朮湯

秦艽

仁膏

各錢

甘草

川芎

當歸

白芍藥

生地黃

熟地黃

白茯苓

羌活

獨活

防風

黃芩

白芷

白朮

各一錢

細辛

分五

右作一服用水二鍾生薑三

片煎一鍾不拘時服如心下有痞加枳實錢一

治中風失音

以白姜蚕七枚為末用酒調服方寸匕立効

治感風不能語

以黃芪防風煮湯數斛置床下薰之

聖散

治中風不能語

沒藥

研

琥珀

各一

乾蝎

七枚

右為末每服三

錢七用鴉梨汁半盞皂角末一錢七濃煎湯盆

盆與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能言

甘竹瀝湯

甘竹瀝

斗 生姜

防風

甘草

各三

防已

麻黃

去節

人參

黃芩

白朮

細辛

茵芋

秦艽

桂心

各一

附子

一枚

右湯

漬藥令赤合竹瀝煮取四升分為四服

白礬散

治一切

急風

白礬

錢五

鹽花

一

右研細末揩齒延下

枳殼人參丸

枳殼炒 人參 羌活各 甘菊各 防風

葛根 桂心各 羚羊角各 熟地各 麻黃

黃連各 薏苡仁炒 右為末 煉蜜為丸 如桐子

大每服二十九漸加至三十九空心酒送下

羌活散

羌活 酸棗仁炒 栢子仁 羚羊角 天麻

骨皮各 鹿角膠炒 白附子炮 側子炮 人參

川芎 薏苡仁 海桐皮 桂心各 犀角

員取肉酒浸各 牛膝二 右為末每服二

錢以豆淋酒調下不拘時候服

人參湯

人參

川芎

枳殼

炒

芍藥

防風

細辛

附子

炮

甘草

炙

桂心

各五錢

桔梗

茯苓

木香

各一分

右每服五錢七分用水一

鍾半姜半片煎至八分去滓溫服

茯苓湯

茯苓

去木

獨活

各四兩

生姜

三兩

黃耆

遠志

防風

各五兩

甘草

人參

當歸

白朮

牡蠣

煨

茯苓

附子

各二兩

右以潑水一斗

二升煮取三升每服五合一日夜盡

六神散

川芎

防風

甘草

羌活

各一兩 鷄蘇

荊芥穗

各兩

右末每服一錢不拘時米飲調下

伏龍肝湯

右用伏龍肝末五升水八升和攪取汁飲之以

盡為善

羌活飲子

羌活

獨活

白茯苓

各一兩 川芎

柴胡

前胡

細辛

麥門冬

各一兩 山藥

黃芪

紫蘇葉

升麻

錢各二半

烏梅

核去

枳殼

炒熱

防風

蔓荊子

藥木

去土

荊芥穗

甘草

炙

桑白

皮

乾葛

一兩

右每服三錢水一盞半生薑

三片薄荷五葉同煎至八分去粗食後溫服

前胡散

前胡

子苓

山施仁

防風

沙參

甘草

甘草

炙

羚羊角

麥門冬

枳殼

一兩

石膏

二兩

右每服三錢水一盞煎六分

去滓不拘時溫服

天竹黃丸



天竹黃各一 硃砂研過水 子苓各一 犀角屑 甘菊

防風 苦參各三 甘草炙 石膏二 右為末

入藥和勻煉蜜為丸如桐子大每服二十九不

拘時煎竹葉湯送下

### 附子散

芍藥 甘草炙 麻黃去根 白朮各一 防風

防已各兩 附子一枚 人參 黃芩去黑 桂心

獨活 川芎各一 天雄一枚 右剉如麻豆

大每服五錢七水一盞半入生姜半分煎至八

分去滓空心日午夜卧各溫服如人行五里

生姜粥投之微汗出與外風

神照散

白茯苓

木香

川芎

藁藥

炒去

人參

獨活

去

黃芪

一分

附子

遠志

各三分

華薛

茵芋

各一

梔子

仁

二

右為末

每服一錢

七分

溫

酒調下加至二錢三錢空心日午夜卧服

至聖一醉膏

滴乳香

沒藥

黃明

各半

附子

一

天麻

安息香

一分

麻黃

四

片腦

許少

右件七味

一處搗

羅為細末每服四錢用法酒一升於銀石器內

熬成膏後却出分在四盞內別用法酒看病人  
喫酒多少漸調膏子服盡為度令枕病處卧以  
衣被蓋汗出或似虫行即効次日再喫一服手  
足必已舉得待五十日已上方治若髮直者不  
在治限俱以不治

### 苦參丸

苦參

二兩  
取粉

丹參

去土

沙參

去土

五加皮

人參

防風

去土

蒺藜

炒去

烏蛇肉

酒浸

蔓荊子

玄參

敗龜板

酥炙  
各一兩

右藥末用不蛀皂角一斤剉碎

以水三升後取汁去滓入無油鐵器內煎熬成

膏用煉蜜四兩拌勻為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜卧共三服冬用薄苛荆芥酒送下

### 附子湯

附子

主去

人參

各半

甘草

炙

乾薑

一分

茴香

茯苓

山藥

各一分

右每服四錢

水二鍾

姜三

片鹽少許煎七分去滓食前服

### 牡蠣白朮散

牡蠣

三錢

白朮

兩半

防風

半兩

右每服五錢

水

二盞煎七分食遠溫服惡風倍加防風白朮汗

多面腫倍加杜蠟

倉公酒

當歸

防風

各三分

獨活

二兩一分

麻黃

一分

細辛

附子

二兩

右每服四錢水酒各一盞煎七分服

口不開者扶開納藥一服甦二服少有汗三服

大汗愈

浸酒藥仙方

四錢不奉者服三日辛  
手十日行步半月除根

甘菊花

防風

去

瓜蒌根

牡丹皮

羌活

白蒺藜

牡蠣

煨

牛蒡子

枸杞子

杜仲

紫苑

葛蒲

人參

各半

白花蛇

桔梗

白朮

山茱萸

去核

白茯苓

晚桑沙

炒

官桂

遠志

牛膝

各二錢半

虎脛骨

牛蒡根

乾姜

車薺

熟地黄

栝子仁

蛇床子

附子

續斷

肉蓯蓉

兔絲子

狗脊

去毛

芍藥

天雄

炮去

石斛

各三錢

右味並要

川廣好者

依方

揀擇為粗末

用新絹袋盛藥用新小瓮兒一箇

放藥在內以無灰酒二斗將藥浸之密封固春

夏浸十四日秋冬浸廿一日開瓮清晨午間臨

夜取冷酒三盞服之每服一盞久病者不過一

月見効男婦小兒骨節四肢浮腫眼目昏暗半

身不遂語言蹇澀口眼歪邪中風失音並治

二陳湯

門見痰

四君子湯

門見氣

四物湯

門見血

大川芎湯

卷開末

五苓散

門見瀉

補中益氣湯

見脾胃

獨參湯

卷開末

橘鼻三聖散

卷開末

麝膏

卷開末

# 頭風門

有二名

頭風有新久留去之分其病日久名曰頭風其痛作止不常愈後遇邪復發但半邊頭痛名曰偏頭風是肝胆二經風邪為之

頭風

年深日久不常痛者名曰正頭風○服天香散用急風散塗貼痛處

偏頭風

或在左邊痛或在右半邊痛名曰偏頭風日久



要損一目。用生蘿蔔汁仰卧滴鼻中左痛滴  
右右痛滴左數十年痛用之皆効服大川芎湯  
川芎四两天麻一两共為細末用蜜五兩搏成  
珠為度入藥末石硃內杵千下作九十九丸每服  
一丸細嚼或湯或酒送下不拘時服

急風散

見頭  
痛門

天香散

開末  
卷

# 大頭風

有一名

大頭風症是四時疫癘之氣初病增寒體重次  
頭面兩耳前後腫大紅赤上喘咽痛口乾舌燥由  
陽明胃經之不利合少陽相火二經之邪熱傳於  
太陽膀胱經視其腫勢在於何部分濕熱為腫肝  
火為痛治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱  
未除中寒復生必傷人命此病自外入內者是血  
分受邪治主病當緩治客病當速先以黃連  
甘草通炒半熟水煎少少不住服服畢不愈用新

瓦上炒鼠粘子有香氣同大黃煎去滓入芒硝少  
許俱各等分亦時時呷之無令飲食腫勢甚者宜  
砭刺之

服普濟消毒飲

開末

# 腦漏門

有一名

夫人身肖天地所以天有四時人有四肢地有四海人亦有之在首謂之腦海在胃謂水穀之海在臍下謂之氣海血海腦海之後名曰風府且諸陽之氣皆會於首設若氣之不足風邪易入歌云腦後入風人不壽風寒入於腦海不得發散停積日久腐壞腦水從鼻流出臭不可近其危有期其門無載關係匪輕於今立之

用辛荑藥本各一兩水五鐘煎至二鐘乘熱入

兩箇瓦酒壺內壺口用紙塞緊壺嘴入兩鼻孔  
薰藥氣到腦海中壺內藥冷以滾湯盪熱每日  
薰三次以瘥為度

# 頭痛門

有二十名

頭痛為病少陰心經是真頭痛旦發夕死夕發旦死其痛甚入連於腦手足寒至節則亡六經令人頭痛雜症頭痛各各不同治之亦異惟傷風傷寒頭痛悉開傷寒撮要一書耳

○生脉

浮滑

○死脉

短澀

○死症

真頭痛

○治法

凡頭痛用一柱金吹鼻中

凡頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

凡頭痛多主於痰痛甚者足火

凡頭痛有血虛者血不上營

凡頭痛有諸經氣滯者氣聚而不行

凡頭痛有吐者有下者

真頭痛

又名眼痛

瘧瘧入陽手足寒至節○服黑錫丹死症用此

太陽膀胱頭痛

惡風寒脉浮緊○服川芎麻黃獨活用羌活主之

少陽胆頭痛

寒熱往來脉絃緩○用柴胡主之

陽明胃頭痛

自汗發熱惡寒脉浮緩長實○服升麻葛根石

膏用白芷主之

太陰脾頭痛



體重腹疼吐痰脉沉緩○用蒼朮半夏主之

少陰腎頭痛

手足寒厥脉沉細○服麻黃附子用細辛主之

厥陰肝頭痛

項痛或痰厥冷脉浮緩○用川芎吳茱萸主之

血虛頭痛

或吐下失血或產後漏痢亡血○用當歸川芎

氣虛頭痛

耳鳴九竅不利久病或肥白人○用順氣和中湯即補中益氣湯加芍藥川芎細辛蔓荊子

風熱頭痛

風熱上攻頭痛不止。服菊花散。

風寒頭痛

在腦中痛眩暈嘔吐不止。服小芎辛湯。

久病頭痛

久病之人畧感風寒便發寒月頭綿裹頭屬熱鬱熱乃標病世人不識悉用辛溫解表藥治宜湯火涼血為主辛溫劑加少許。

壯熱頭痛

大便秘燥者。用大承氣湯。

肥人頭痛

多是濕痰。用半夏蒼朮為主藥

瘦人蒼黑人頭痛

屬熱血虛。用酒炒黃芩川芎當歸

食積頭痛

胃中有食積不化上攻作痛右寸脉緊盛。服  
備急丸

勞役頭痛

下元虛乏人因勞碌非傷寒似傷寒一般樣發  
熱兩太陽作痛此相火自下冲上。服補中益

氣湯加川芎當歸甚者加知母蔓荊子

痰厥頭痛

用川芎茶調散或用瓜蒂散吐之

頭頂痛

用藁本柴胡防風

腦痛

名曰腦風

大寒犯腦腦痛極齒亦痛脉緩大難治○服羌

活附子湯

羌活附子湯

麻黃

黑附子

防風

白姜蚕

白芷

黃芩

各三分

羌活

蒼朮

各五分

黃芪

一分

升麻

甘草

各二分

佛耳草

三分無寒者去之

右用水一鍾半煎

至七分食後服

小芎辛湯

川芎

細辛

白朮

炒

甘草

各五分

右用

水二鍾半生姜五片茶芽少許煎一鍾食後服

本事方

治八般頭風

草烏尖

細辛

各等分

右以黃丹少許為末搗入

鼻中立効

治頭痛不可忍

青黛錢二

玄胡索

枚七

稻牙皂角箇二右為末水丸

成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧水化開用竹管送入鼻中男左女右鼻中覓藥至喉少酸令病坐却令咬定銅錢一箇於當門牙當見涎出成病即愈

搗藥灰蒂散

治偏頭久不愈是溫氣在頭也

灰蒂一味為末少許吹鼻中清水徐徐出痛止為度○張子和默目出淚搗鼻出涕口含漉涎皆同乎吐也

貼藥

誠病搜法卷下

頭痛

防風

羌活

各三

紅豆

紅三

右為末和葱白搗

泥為膏貼兩額上

菊花散

甘菊花

梗去

旋覆花

核去

防風

去

川羌活

去

枳殼

蔓荊子

石膏

煨

甘草

炙

各右作一服水二

鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

大川芎丸

川芎

兩四

天麻

兩一

右為末煉蜜和丸每兩作十

丸每服一丸細嚼茶任下不拘時服或酒送下

急風散

川烏

生去  
皮臍

辰砂

研各  
一兩

南星

生用  
二兩

右為末

用酒調

塗痛處小兒貼顙門

大芩辛湯

頭風

生附子

生烏頭

天南星

乾姜

細辛

川芎

各一  
兩

甘草

分三

右每服四錢水二鍾生姜七

片茶芽少許煎至六分去滓食前服

葫蘆巴丸

葫蘆巴

炒

三陵

剉醋  
炒

乾姜

炮

各一  
兩

右為末用韭根

取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄

荷茶清送下



止痛太陽丹

天南星 川芎各等 右為末用連鬚葱白同搗

爛作餅子貼於太陽痛處

治頭痛不可忍者

右用蒜一顆去皮研取汁令病人仰卧垂頭以

銅筋點少許滴入鼻中急令搐入眼中淚出瘡

黑錫丹

葫蘆巴 破故紙炒 川練子 茴香炒 巴戟

附子各一兩 肉豆蔻各一兩 木香五錢 錫礬砂四兩 沉香

桂心各五錢 右為末同研勻酒煮麵糊和丸如梧

桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九空  
心姜鹽湯送下一方有陽起石

順氣和中湯

黃芪

錢半

人參

錢一

白芍藥

當歸

陳皮

白朮

各五分

升麻

訖胡

各三分

蔓荊子

細辛

川芎

各二分

甘草

二分

右作一服水二鍾煎至一盞

去滓食後溫服

治偏頭痛不可忍方

草麻肉

兩半

大棗

十五枚

右研令熟塗於紙上用

筋一隻捲之去筋入鼻中良久取下清涕即止

治頭風攻注口眼不正

金蝎

三枚去毒

赤足蜈蚣

一條

射香

許少

辰砂字一右

為細末酒調下一字食後服

治眉并梁骨疼

用二陳湯送下青州白丸子立驗

備急丸

見積聚門

補中益氣湯

見脾胃門

二陳湯

見痰門

青州白丸子

見

一柱金

見

川芎茶調散

見開末卷

大承氣湯

見胃門

# 心痛門

有二十八名

心為君主之官百骸之所以聽命者也心之正經  
果為風冷邪氣所干氣血痰水所犯其痛掣背脇  
脹胸煩咽乾兩目赤黃手足俱青主節名曰真心  
痛旦發夕死夕發旦死心之包絡與胃口相應往  
往脾痛連心諸心痛者皆少陰厥陰之氣上衝也  
遂有九種心痛之名一虫二疰三風四悸五食六  
飲七冷八熱九來去且古人論諸心痛皆因六淫  
七情所致有寒厥有熱厥有實大有房勞饑飽跌

蹊以成諸痛也

生脉

建二

沉

細

死脉

道四

浮

大

絃

長

難治脉

道三

堅大實

浮大長

滑數緊

死症

名一

真心痛

治法

凡心膈痛須分新久若知身受寒氣口食寒物  
初得之時宜溫散或溫利之藥病稍久則成  
鬱熱熱久生火

凡治此病須問平日起居何如有因平日喜食  
熱

凡心痛用溫藥附子之類不可用參朮亦不可  
用純寒純熱之藥

凡心痛用山梔并劫藥止之又復痛者前藥必  
不効以玄胡索為末一服立愈

凡心痛調血順氣逐水豁痰

凡心痛熱者涼之寒者溫之風者散之

凡心痛用山梔為主加熱藥為向導則邪易伏而病易退山梔十五枚大者九枚去皮炒濃煎佐以姜汁令辣服之或以二陳湯加川芎蒼朮倍梔子煎服甚者加乾姜輕者以麻黃桂枝之類散之或以桔梗韭汁開提之再重者加石醵

真心痛

胸脇脹煩咽乾兩目赤黃手足俱青

熱厥心痛

其症身熱足寒痛甚煩燥吐額自汗其熱厥無  
凝脉浮大洪○用金鈴子散

寒厥心痛

手足冷通身冷汗出尿清大便利不渴氣微力  
弱○急以术附湯温之

大實心痛

因氣食率然發痛大便成秘久則注悶心胸高  
起按之愈痛不能飲食○宜煮雄丸下後以藁  
本湯去其邪也

病久心痛



病久氣血虛損及素作勞羸弱之人皆虛痛也  
○虛以炒鹽補之

足厥陰心痛

兩脇急引小腹連陰股徹背心煩掌中熱咽乾  
目黃赤脇滿○

足太陰心痛

腹脹滿大便不利膈閉咽塞○

手太陰心痛

短氣不得倚息季脇空痛遺尿胸滿煩心○

足少陰心痛

煩劇面黑心懸若飢胸滿腰脊痛

風冷寒邪心痛

服加味四七湯

熱氣乘心作痛

服靈脂酒

開末卷

婦人惡血入心脾痛猶甚別樣心痛

服桃仁承氣湯

見痢疾門

瘀血心痛

平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛○服

桃仁承氣湯

見痢疾門

諸虫心痛

心腹痛懊懷發作腫聚往來上下行痛有休作喜渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐清水○服蕪荑散

急心痛

禁了牙關欲死者可急散○將隔年老葱白三五根去皮須搗為膏以病人口幹開用茶匙將膏送入喉中香油四兩灌送葱膏油不可少但得葱膏下喉中其人即甦少時將腹內停虫病

物化為黃水微利為佳

卒心痛久不愈

服玄胡索散

發熱心痛

內攻五臟拘急不得轉側○服加味麻黃湯

七氣心痛

喜怒憂思悲恐驚七情為病心腹刺痛不可忍

或外感風寒濕氣作痛者○服加味七氣湯

胃心痛

腹脹滿不下食雖食不消化○服藳急丸

見續

飲啖生冷心痛

菓菜冷飲留積中焦心脾大痛○服煖脾散  
痰飲心痛

咳逆上氣○用海蛤粉煨灰菱仁帶穰等分研  
細米糊丸如棗豆大每服二錢食後白滾湯下  
虛心痛

心痛時以手按心就不痛者○用二陳湯加乾  
姜炒黑煎服

心大痛

走注胸背發厥諸藥不効即用吐藥先以鴉毛

探吐

因怒氣心痛

用木香枳榔丸

見種  
果門

肝心痛

色蒼蒼如死狀終日不得太息○

脾心痛

如針刺其心腹蘊蘊然氣滿○服手拈散

肺心痛

從心間起動作痛益甚不變色○

腎心痛

與背相引善如物從後觸其心身偃倮○

九痛丸

治九種心寒

附子

炮三錢

吳茱萸

炒

生狼牙

灸

巴豆

去皮研

人參

乾姜

各一錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大強壯

人每服三丸酒送下虛弱人一二丸

術附湯

白朮

炒四兩

甘草

炙一兩

附子

炮

去皮

錢

右分作十

服每服用水一鍾半煎至八分食後溫服

金鈴子散

金鈴子 玄胡索各一兩 右末每服三錢酒調下  
手拈散

草菓

玄胡索

炒

五靈脂

沒藥

各半

右為

末每服三錢溫酒調下

加味七氣湯

半夏

二兩五錢

玄胡索

炒

桂枝

各五錢

乳香

一錢

人參

甘草

各半二錢

右分作十服每服水一鍾半生姜二

片煎至七分食後溫服

加味四七湯

桂枝

白芍藥

半夏

製

人參

各錢

厚朴



白茯苓 枳殼 甘草 二錢各 紫蘇 半錢 右作一

服用水二鍾生姜五片紅棗二枚煎至一鍾服

失笑散 治心腹痛

五靈脂 蒲黃 各等 右為末每服二錢醋調敷

成膏入水一盞食前溫服

玄胡索散

玄胡索 一兩 甘草 二錢 右作一服用水二鍾煎至一

鍾服如吐逆分作三五次服

加味麻黃湯

麻黃 節 白芍藥 半夏 製 乾姜 炮 桂心

香附

炒

細辛

錢各一

甘草

炙半錢

右作一服用水

二鍾生姜五片煎至一鍾食前服

煖脾散

乾姜

炮

厚朴

麥芽

炒

草薹仁

橘紅

神麴

炒

良姜

炒

砂仁

甘草

炙各等分

右為

末每服三錢不拘時用熱鹽湯調服

煖胃散

右將茱萸同四色炒過良姜再同炒令乾碾為

末用浸茱萸酒煮麴糊和丸如桐子大每服五

十九更看病人腹中冷熱加減空心生姜湯下

蕪荑散

蕪荑

雷丸

各半 乾漆 搗研 以大

右為末每

服三錢溫水調和 不拘時服 甚者不過三服

煑雄丸

雄黃

兩一

巴豆肉

半兩

白面

兩二

右水丸

如梧桐子

大每服時先煎沸湯下藥二十四粒煑三十沸

撈入冷水沉水冷一時下二丸一日夜二十四

丸加至微利為度用浸藥水送下

二時湯

見痰

藁本丸

開未

# 脇痛門

有二十六名

兩脇痛引小腹善怒厥陰肝經自病也左右脇而為陰陽之道路肝生於左連於右左脇痛者多因留血右脇痛者悉是痰氣論病之由當分外之六淫內之五邪推其感氣別其左右辯其氣血痰積量其形症虛實用藥則可收其全功也

○順脉

絃 瀉

○逆脉

洪大

○辯驗脇痛來歷法

肝中風

左脇偏痛

肝中寒

左脇痛

肝實肝虛筋實

飲水

脇下鳴

懸飲息積

九者右

妨於食脇痛

肝傷

血枯症脇胸支滿

肝氣不行

胆實熱

左脇痛

脇痛病至先聞腥臊氣出清液

肺病之

○熨法

脇痛用芫花菊花躑躅花等分用布囊貯蒸熱熨痛處令復易之服木通散

○治法

凡脇痛用熨痛法或貼法

凡脇痛用當歸龍會丸瀉肝火要藥

凡脇痛大率有三肝氣實用川芎蒼朮青皮肝  
火盛用當歸龍會丸死血用留失桃仁紅花  
川芎香附青皮

兩脇痛

痛引小腹善怒○服木通散

左脇痛

蓄血○服枳芎散

右脇痛

痰積○服推氣散

兩脇走注痛

用控涎丹

氣弱人脇下痛

或因勞碌怒氣作痛○用八物湯加木香青皮

肥人因氣虛發寒熱脇下痛

補虛用參芪退熱用柴胡黃芩調氣用木香青

皮

左脇下痛

發寒熱多怒者必有瘀血用桃仁紅花當歸柴  
胡青皮大黃梔子龍胆草

發寒熱脇痛

似覺有積塊○服龍會丸

食積脇痛

脇下有一條紅起○用吳茱萸黃連

寒氣脇痛

脇引小腹○服木通散加桂

濕氣脇痛

濕勝能化痰停脇間作痛○服二陳湯加蒼朮



識病捷法卷木 脇痛

四四

澤瀉青皮

燥甚脇痛

兩脇下小腹俱痛○服木通散加酒炒當歸

火熱脇痛

脇肢滿痛連胸中○服木通散加黃芩

肝熱脇痛

手足燥不得安卧○服木通散加柴胡酒炒黃

芩

肝欬脇痛

兩脇下滿痛甚不可轉側○服木通散

脾欬脇痛

右脇痛引肩背○服木通散

肝鬱脇痛

胃脘當心痛至兩脇咽膈不利飲食不下○服  
青皮陳皮各一錢柴胡三分為末酒調下

胃經脇痛

心脇痛不能轉側○服調胃承氣湯

胆經脇痛

痛不得息咳而汗出○服小柴胡湯加青皮

膀胱脇痛

藏病兼法卷六 脇痛

拘攣背急升脇痛○服木通散加羌活

心經脇痛

先心痛一日後欬脇痛○服木通散加玄胡索

肺經脇痛

先肺病三日後頭目眩昏脇滿痛○服木通散

加防風

肥氣脇痛

肝血蓄左脇作塊為肝積名曰肥氣○服芳歸

芍藥湯

息奔脇痛

肺氣鬱在右脇痞硬而痛喘欬為肺積名曰息奔○服白朮丸

傷寒脇痛

見傷寒門

七情脇痛

喜怒憂思悲恐驚七氣鬱在中脘不快胸脇痛

脹○服香橘湯

推氣散

片姜黃

枳殼

麩炒

桂心

各五錢

甘草

炙

二錢

右為

末每服三錢姜棗湯調下食遠服

枳芩散

枳實

川芎

錢各五

粉草

錢各二

右為末每服二

錢姜棗湯調下食遠服酒調下亦可

香橘湯

香附

炒

橘紅

半夏

錢各三

甘草

錢各一

右作

一服水二鍾姜五片紅棗二枚煎一鍾食遠服

小柴胡湯

柴胡

黃芩

錢各二

人參

半夏

錢各半

枳殼

牡蠣粉

甘草

錢各二

右作一服水二鍾生姜三

片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

木通散

木通

去節

青皮

去白

蘿蔔子

炒

茴香

炒

川練

子

取

法

用

巴豆

半兩

同

炒

黃

滑石

研

另

莢木

木香

錢

五

右為末

每服三錢

不拘時用葱白湯

調服

即愈甚者不過三服

白木

丸

枳實

官桂

各兩

人參

二兩

陳皮

桔梗

少醋

甘草

各一兩

右為末

煉蜜為丸

如梧桐

子大

每服五十丸

不拘時溫酒送下

日三服

白木

丸

枳實

官桂

各兩

人參

二兩

陳皮

桔梗

少醋

甘草

各一兩

右為末

煉蜜為丸

如梧桐

子大

每服五十丸

不拘時溫酒送下

日三服

白木

丸

枳實

官桂

各兩

人參

二兩

陳皮

桔梗

少醋

甘草

各一兩

右為末

煉蜜為丸

如梧桐

子大

每服五十丸

不拘時溫酒送下

日三服

白木

丸

枳實

官桂

各兩

人參

二兩

陳皮

桔梗

少醋

甘草

各一兩

右為末

煉蜜為丸

如梧桐

子大

每服五十丸

不拘時溫酒送下

日三服

白木

丸

枳實

官桂

各兩

人參

二兩

陳皮

桔梗

少醋

甘草

各一兩

右為末

煉蜜為丸

如梧桐

子大

每服五十丸

不拘時溫酒送下

日三服

當歸龍會丸

草豆膽

當歸

梔子

黃連

各一大黃

蘆薈

青黛

錢各五

木香

錢二

黃芩

兩一

麝香

分五

右為末神麴糊為丸姜湯下有方用柴胡半兩

青皮

兩一兩

貼法

用芥菜子水研付或茱萸醋研敷或琥珀膏貼

控涎丹

開末

調胃承氣湯

見門

龍會丸

開末

芎歸芍藥湯

開末

八物湯

開末

一陳湯

見痰

# 腰痛門

附腰軟有  
三十三名

腰乃腎之府轉搖不能腎將憊矣且人之腰一身之關節六經皆貫於腎而終於腰脊腎氣一虛諸邪易入或風寒暑濕客之或血凝氣滯鬱鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通其症遂作未嘗不由腎虛及肝脾所致緣腎肝脉通脾胃也

總脉

沉滑遲可治 沉緊絃寒邪 沉絃浮風邪  
沉絃濡細濕 沉實為熱邪 沉絃實閃肭



沉瀆氣血病 車瀆瘀血痰 尺脉大腎虛

○不治症

腎憊腰痛不能轉側

○治法

凡腰痛用磨腎膏止除房勞并熱痛餘病並用  
凡腰痛日輕夜重是瘀血宜行血順氣藥加桃  
仁

凡腰痛久而不治則成痿

凡腰痛不宜補氣藥亦禁寒涼

凡腰痛不已是腎虛用杜仲龜板黃柏知母枸

杞子五味子

凡腰痛用如神湯甚者不過二服熱痛勿用

凡腰痛遇天陰或久坐作痛是濕

凡腰痛四肢緩足寒腰冷如冰冷汗精滑濕熱

用蒼朮柴胡黃柏杜仲川芎桂等分

凡腰痛房勞者多其痛引脊舉之欠便

凡剉閃腰痛山查肉四兩北茴香炒二兩為細

末酒下

腎着腰痛

腰冷如冰身重不渴小便自利飲食如常腰重

知帶五千錢。服腎着湯。即四君子湯去參加  
乾姜。

腎肝腰痛

腰間滯滯而涼。服牛膝丸。

太陽膀胱腰痛

腰痛引項脊尻背如重伏。服如神方合附子  
理中湯。

陽明胃經腰痛

痛時不可以顧顧則如有所見善悲。用蒼朮  
當歸各五錢水煎服。

少陽膽經腰痛

痛時如針刺皮不可以俯仰○服小柴胡湯加酒炒黃芩

太陰脾經腰痛

痛時發熱熱甚腰內如有橫木居其中再熱甚遺尿○用蒼朮當歸各五錢水煎服

少陰腎經腰痛

腰痛引脊內熱○服如神方合附子理中湯

厥陰肝經腰痛

痛時如弓張弩絃善言嘿嘿然不慧○服小柴

胡湯加酒炒黃芩

解脉腰痛

是膀胱經列脉

腰痛引肩晄晄然時遺尿○服

絡脉腰痛

胆經別絡

痛時如引帶常若折腰狀善恐○服

陽維脉腰痛

痛時如小鍾居其中怫然腫○服獨活湯

太衝脉腰痛

痛處怫然腫○服

會陰脉腰痛

是膀胱經中經

因舉重傷腰惡血歸脉痛時不可俯仰○服如神方加蘇太紅花

陰維脉腰痛

痛時深潔然汗出汗乾欲飲○服如神方

陰驤脉腰痛

痛時拂拂然悲恐○服如神方

肉裡脉腰痛

是少男生別脉

腰痛引膺目眈眈然如反折舌捲不能言○服

如神方

從高墮下腰痛

服桃仁承氣湯

寢卧濕地腰痛

服麻黃蒼朮湯

脾滯胃閉腰痛

用鷄心枳櫛磨老酒食後服

房勞腰痛

腰與脊痛不能舉○治宜補陰助陽

血滯腰痛

血氣不行則沉痛不能轉側○服如神方

氣滯腰痛

氣鬱氣滯自覺氣不舒暢○服如神方

老弱人腰痛

痛時不可屈伸○服二至丸

閃挫腰痛

痛時不能轉側○服神麴酒

鬱怒憂思腰痛

自覺為四者作痛○服七香丸

冬月露卧感寒腰痛

服川芎肉桂湯

風寒腰痛



攻刺痛。服獨活散。

風濕腰痛

生苗茶插入香油十滴煎數沸入川芎升麻末吐之。

寒濕腰痛

身體沉重面色痿黃不澤。服麻黃蒼朮湯又用摩臍膏法。

濕熱腰痛

肢節煩疼肩背沉重胸膈不利及遍身疼注足脛腫。服蒼朮湯加黃柏。

停痰腰痛

用二陳湯加天麻

勞役腰痛

因勞碌痛如折沉重如山○服獨活湯

腰軟

因腎肝伏熱○用黃柏鹽水炒防已

腎着湯

茯苓

白朮

炒各四兩乾姜

甘草

炙各二兩右分

作十服每服用水二鍾煎至一鍾空心冷服

川芎肉桂湯

羌活

生

柴胡

薤仁

當歸尾

肉桂

蒼朮

生

甘草

炙

獨活

神麴

炒

防風

漢防已

酒製

各

右好酒

三鍾煎至一鍾食前煖

處溫服

麻黃蒼朮湯

麻黃

澤瀉

白茯苓

陳皮

各一錢

桂枝

半夏

橘苓

各五

杏仁

十箇

蒼朮

二錢

黃芪

甘草

炙

各

神麴

炒

一

右水二鍾煎一鍾食前服

獨活湯

羌活

獨活

防風

大黃

煨

桂

澤瀉

三錢各

甘草

錢二

當歸

連翹

兩各半

黃栢

防已

兩各一

薤仁

酒三十泡去皮

右分作五服每服用

酒水各一鍾煎至一鍾空心熱服

蒼朮湯

蒼朮

米泔拌炒

柴胡

錢二

黃栢

錢一

防風

錢一

右用水

一鍾半煎至七分空心溫服

七香丸

丁香

香附子

炒

甘草

各兩二錢

松香

錢八

鹽

蓬朮

炒

砂仁

錢二

右為末水浸蒸餅為丸如

菴豆大每服三十丸米湯送下

地龍散

桂

分四

薤仁

分六

羌活

錢二

獨活

當歸

黃柏

一錢

各

升麻

分五

地龍

分四

蘇朱

分六

甘草

錢一右用水二鍾煎至八分食遠服

摩腰膏法

附火

烏頭尖

南星

錢各二

雄黃

樟腦

丁香

半錢

朱砂

乾姜

錢各二

射香

小

石為細

末煉蜜為膏姜汁化放掌中大上烘熱在痛處

摩之

二至丸

附子皮去桂心不見杜仲去補骨脂炒各

鹿角鎊麋角鎊各鹿茸酒炙青研各右

烏末酒煮糊和丸如桐子大每服七十丸空心

溫酒送下

神麴酒

右用陳久神麴一大塊燒通紅淬老酒去神麴

通口吞青娥丸兩服頓愈一方不用青娥丸只

服酒後仰卧片時未効再服

牛膝丸

牛膝 訶黎勒 附子 當歸各一乾姜

芫薺

各半

桂心

白芍藥

白朮

各三

厚朴

去皮塗生薑汁炙黃香熟一兩五錢

羌活

分三

右為末酒煮糊為

丸如桐子大每服三十丸食錢溫酒送下

如神方

杜仲

系沙去

木香

各四兩

官桂

兩一

右為末每服二錢

空心用溫酒調服此藥活血化氣

附子理中湯

見寒

小柴胡湯

見瘧疾門

桃仁承氣湯

見血

四君子湯

見氣門諸

摩腎膏

卷陸末

二陳湯

見痰

# 腹痛門

有二十五名

頭與背輕清象天屬陽主氣司熱故言頭圓象天  
諸陽之氣皆會於首風熱所傷上先受之足與腹  
重濁象地屬陰主血司寒故言足方象地諸陰之  
血走五臟濁陰歸六腑寒濕所傷下先受之臟腑  
藏於腹惟夏令能受病也夏月陽氣發散在外陰  
氣在內譬井中之水夏月冷而冬月溫也所以腹  
痛之因多於寒也經云寒氣入經而稽遲泣而不  
行客於脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然



而痛卒然而止或痛甚不可按或按之痛止或不  
止或喘動應手或脇肋與小腹痛引陰股或痛死  
少間復生或嘔或瀉或小便不禁者皆寒氣之為  
病又曰綿綿而痛無增減者寒也熯之以熱痛痰  
痛食積痛蓄血痛虫痛未必不由腹之衰薄寒濕  
之氣相煎鬱積致生諸病而成痛也鬱積之久遂  
生熱耳雖有熱痛十之一二也

○生脉

細、小、遲

○死脉

堅大疾 浮大長 數緊

○辯驗腹痛法

在中痛食積痛甚欲大便利後痛減

在左痛死血痛有常處而不走移

在右痛是痰或得辛辣熱物暫止

在下痛蓄血小便清利手不可近痛處

在下痛蓄尿小便不行手不可近痛處

在下痛亦有屬食積必少食利後痛減

痛甚不可按者是實邪 熱痛時作時止

痛時按之痛止是虛邪 寒痛無增無減

痛死復生是寒氣入經

虫痛唇紅額白

心至小腹硬滿痛實邪

肥人腹痛是氣虛

脇至小腹引痛瘵死血

瘦人腹痛是火邪

○不治症

臍下大痛人中黑死

腹痛發喘兼脉滑死

○治法

凡卒腹痛先用食鹽一把調水送下以鷄羽探吐有痰即吐無痰其痛即止

凡治腹痛須分三陰部分○中脘太陰○臍腹

少陰○小腹厥陰

凡人壯實初發腹痛元氣未虛宜推蕩之

凡人虛弱經久腹痛元氣已虛宜消導之

凡雜症腹痛者用酒煮當歸丸主之

凡四時腹痛者用芍藥甘草湯主之

凡夏月腹痛肌熱惡寒脉洪黃芩芍藥湯主之

凡秋冬腹痛肌寒惡寒脉沉桂枝芍藥湯主之

凡腹痛不宜用參朮

凡肥白人腹痛是濕痰用半夏人參二朮

凡瘦黑人腹痛是實熱以大黃朴硝下之

凡氣滯腹痛用木香枳榔枳殼香附

凡血阻腹痛用川芎當歸桃仁紅花

凡腹痛久病實熱大便秘者用潤腸丸

凡臍至小腹痛多屬食用山柰神麴蒼朮青皮

凡腹痛因飲食過傷用木香枳榔丸下之

凡腹痛因跌撲損打或蓄血用承氣湯加桃仁

當歸紅花蘇木下之

凡氣虛人傷飲食腹痛宜調補胃氣并消導之

凡腹痛因痰而作者用滾痰丸

凡腹痛因虫而作者用川楝樹根皮枳榔鶴虱

凡腹痛因中氣虛而作者用理中湯

凡腹痛因熱用二陳湯加黃芩黃連梔子甚者  
加乾姜

凡腹大痛脉沉細實用附子理中湯合大承氣  
湯下之

老人腹痛

因年老元氣虛初痛不經下者○服芩朮湯

傷食腹痛

因飲食太過而作痛者○服木香枳榔丸

虛人腹痛

因稟氣弱又因飲食過傷○用人參白朮木香

神麴枳實枳榔用水二鍾煎服

損傷腹痛

或用力舉重墻屋壓體從高跌下打傷○服桃仁承氣湯加當歸蘇木量傷輕重加減

傷暑腹痛

見暑門

陰毒腹痛

見痼冷門

疝氣腹痛

見疝門

泄瀉腹痛

見泄瀉門

積聚腹痛

見積聚門

腸癰腹痛

見外科門

痰飲腹痛

見痰飲門

傷寒腹痛

見傷寒門



傷熱腹痛

見積熱門

痢疾腹痛

見痢疾門

酒積腹痛

見內傷門

死血腹痛

見諸血門

蓄溺腹痛

見小便門

諸虫腹痛

見諸虫門

肥人腹痛

用半夏蒼白朮為主

瘦人腹痛

用酒蒸大黃為主藥

心至小腹痛

心至小腹滿悶而痛未經服吐藥瀉藥用鹽五  
合水一鍾煎令鹽消頓服即吐不吐再服或用  
布裹花椒薄鋪痛處以火熨之令微汗出妙

脇至小腹痛

用木香枳榔丸煎青皮湯送下

七情腹痛

自知為七情氣不舒作痛。服七氣湯

遶臍腹痛

脉實腹滿大便閉。服太承氣湯

腹中鳴痛

是火擊動其水也。水欲上火欲上相觸而然。用

二陳湯加梔子大黃黃芩黃連

芫花丸

巴豆霜分五 三稜兩 神曲兩 木香錢二 香附

草豆蔻錢五 升麻錢三 柴胡錢二 右為末

蒸餅丸如菜豆大每服二十丸白滾湯送下亦

須量所傷多少服之

七氣湯

益智 陳皮 蓬朮煨 三稜 青皮

桔梗 薄桂 香附炒 藿香葉 甘草

各等分 右用水煎服

酒煮當歸丸

當歸兩一 茴香錢五 附子炮 良姜錢七 右四

味酒煮乾炒黃鹽丁香各五全蝎三柴胡二升  
麻木香一苦棟五甘草五玄胡索四錢右為  
末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心白  
滾湯送下

為藥甘草湯

為藥

甘草

各等

右用水煎服

黃芩為藥湯

黃芩

為藥

甘草

各等

右用水煎服

桂枝為藥湯

桂枝

為藥

甘草

各等

右用水煎服

桃仁承氣湯

理中湯

見血門

見寒門

木香枳榔丸

滾痰丸

見氣門

見痰飲門

附子理中湯

潤腸丸

見寒門

見秘結門

大承氣湯

承氣湯

見脾胃門

見積聚門

二陳湯

芩朮湯

見痰飲門

開末卷

# 諸虫門

有十七名

諸虫皆由臟腑不實脾胃俱虛停積濕熱雜食生冷甘肥油膩等物節食不時腐敗留滯所以發生又有神志不舒精魂失守及五臟勞熱久病餘毒氣血積鬱而生或食瓜果禽獸內藏遺留諸虫之類而生惟蟻虫寸白虫疳虫人多有之五臟生虫皆能殺人但心肺之虫居肺葉之內治之為難虫之名病固多追取虫法則一虫去何憂病不痊也故選二方摠治諸虫虫盡則當大補脾胃而無復

生之患矣

○生脉道二

虛小

○死脉道二

緊急

○死症

癆虫食肺喉啞聲嘶

○辯驗虫痛法

虫作痛口唇紅額上白色如銅錢大以此為  
驗令人清朝吐沫平時嘔水乍痛乍止聚腫



無定處惑虫食臟上唇内生瘡狐虫食肛門  
下唇内生瘡小兒肚大青筋起者內有疳虫

○治法

凡上半月虫頭向上易治五更先以糖一二匙  
或肉汁五六匙後服九虫散或化虫丸

凡初一起至初七日止每日五更將白沙糖伴  
榧子七枚食之七日食七七四十九箇搃治  
諸虫

凡治瘋虫必用花蛇為主  
凡治癆虫必用白色鰻魚

凡治廢虫必用鷄醴酒

凡治癰虫必用驢屎

凡治後開九虫條下各有湯藥總不如先服九虫丸一次隔數日候至初一起食樵子法除九虫之外其他之虫為病照依各虫條下湯丸散服去

伏虫長四

群虫之主

蛭虫

長一尺又各長虫又名蟲虫性五臟

貫心殺人○服雷丸

白虫

長一寸相生于孫轉  
大長至四五尺後人

生於脾令人胸中咳嘔而不出○服白弱二虫

酒

寸白虫

形

食牛肉白酒所生相連一尺則殺人損人精氣  
力乏腰疼○服南木香檳榔各一錢五分米飲  
下五更先嚼猪肉二三塊去肉粗嚥汁後服藥  
辰巳時下虫

肉虫

狀如  
開杏

生於肝令人煩滿○

肺虫

狀如金形

生於肺葉內蝕人肺絲成癆咯血聲嘶藥不到

令人咳嗽氣喘或氣膈寒膈熱膈名曰膏肓○

服蚕豆丸

胃虫

狀如粟

生於胃令人嘔吐噦○服白朮二虫酒

弱虫

狀如底餅又名隔虫

令人多唾○服白朮二虫酒

邪虫

狀如肉

令人腸鳴○服三虫湯

蟻

其狀如菜其惡

令人心痛清朝口吐沫煩燥生於腎居胴腸多則為痔劇則為賴因人瘡瘻即生諸癰疽癰痿痛疥婦人常多其虫凶惡人之極患也常以白蓮草煎湯浴根葉皆可用屍虫所畏。服屍蟻散

蟻

食臍上唇内生瘡。服湯心湯

狐

食肛下唇内生瘡。煎苦參湯浸洗大便。又

方用長股蝦蟆青背者一枚鷄骨燒灰一分和  
勻吹入肛門內

疳虫

兒童多有令人昏睡煩燥鼻爛汁臭齒斷生瘡  
惟傷寒天行熱病腹內有熱虫行求食須頻頻  
看驗唇內有瘡口服安虫散

蛔虫

長一尺或五六寸貫心  
死此虫是九虫之一也

令人腹中痛發作腫聚行來上下痛有休止腹  
中熱口吐清水○服集効丸

陰虫

多淫婦人因陰戶內有黑頭小虫○用軟鷄肝一枚熱湯暖之入於陰戶良久取出其虫鑽入肝內則不淫矣

小兒肚大青筋

因腹內有虫○用取虫丸

濕虫

用青黛一兩黃連黃柏丁香各五錢麝香少許脂為丸如棗大入下部一日換二次

九虫散

狼牙

貫衆

鶴虱

絲上

燕莢

各一兩

右為

末每服一錢粥飲調下良久取服虫出為度  
三虫湯

栳榔三枚以灰火煨搗為末用水三盞煎一盞半  
綠綿利去粗分三服空心午間臨夜各一服其  
虫盡下未盡再服

雷丸

去心

雷丸

灰火

陳皮

去白

杏仁

湯泡

貫衆

大者

蕪荑

青箱子

炒

乾漆

炒令

狼牙

各一

亂髮

如鷄子大

一團

右為細末煉蜜和丸

如梧桐子大

每服十五丸

空心好酒送下



屍蟻散

治腎

貫衆

大者三枚

白蕪荑

炒

胡粉

炒各一兩

杏仁

去皮炒五錢

右

為末每服二錢空心井水調下日晚再服

白朮

二虫酒

去脾

麻子

八合

陳皮

二兩

吳茱萸

根一尺

右搗陳皮

麻子如泥後拌茱萸根酒一斗浸一宿慢火上

微煎攪去渣分作五服每服空心飲虫下為度

合下時不要說話

蚕虫方

去肺

桑白皮

升一

狼牙

洗半兩

吳茱萸

根皮二兩

右用酒七升

煎至二升去粗每日空心一服虫下為度  
瀉心湯

大黃

黃連

黃芩

各一兩

右為末白沸湯

調服二錢

苦參湯

苦參

十兩

搥碎煎濃湯洗大便

取虫丸

牽牛

三錢

楸榔

錫灰

各五錢

大黃

六錢

右為末

滴水丸如梧桐子大每服十五丸用史君子煎湯送下虫下為度

化虫丸

鶴虱

去土炒

檳榔

練根

胡粉

炒各一兩

白枯

礬

二錢半

右為末糊丸麻子大每一歲光服五丸

論歲數加去服之下虫為度

安虫散

胡粉

炒

檳榔

川練

去

鶴虱

各一兩

枯白礬

錢一

右為末滴水丸如粟米大每服五分

白滾湯送下

集効丸

木香

鶴虱

去土炒

檳榔

訶子

煨

蘇莢

附子

煨

乾姜

各五錢

大黃

一斤

右為末

煉蜜和丸

如梧桐子大每服三十丸食前白滾湯送下

鷓鴣

醃酒

用木